ATMINTINĖ PO DANTŲ IMPLANTACIJOS

Atlikus dantų implantaciją, pirmąją parą po procedūros venkite fizinio aktyvumo – daugiau sėdėkite ir gulėkite, viršutinę kūno dalį laikydami aukščiau. Taip pat venkite karšto, kieto maisto ir gėrimų, nekramtykite operuota puse, neskalaukite burnos ertmės.

Nemalonūs pojūčiai

- Atlikus operaciją, gali pasireikšti kraujavimas, kuris dažniausiai praeina po kelių valandų. Esant patinimui, išorinėje veido pusėje priglauskite ledo kompresą – laikykite jį 20 minučių su tokios pačios trukmės pertraukomis kas 4–5 valandas.
- Siekiant mažinti skausmą, vartokite skausmą mažinančius vaistus pagal gydytojo paskyrimą.
- Siūlės išimamos po 7 dienų.

Asmeninė burnos higiena

- Pirmomis dienomis būkite ypač atsargūs, burną skalaukite burnos skalavimo skysčiu (išskyrus pirmąją dieną).
- Po kelių dienų implantuotą vietą valykite minkštu šepetėliu, o išėmus siūlus sugrįžkite prie įprastos higienos: naudokite minkštą dantų šepetėlį, pastą, tarpdančių šepetėlius, siūlą, liežuvio valiklį. Taip pat kas pusę metų (o prireikus, ir dažniau) lankykitės profesionaliai burnos higienai.

Žalingi įpročiai

- Bent 2 savaites po operacijos nerūkykite, o 7 dienas – venkite alkoholio.

Vilnius
Tel.: +370 616 11555
El. paštas: info@forumdentis.lt

Palanga
Tel.: +370 616 11555
El. paštas: palanga@forumdentis.lt

www.forumdentis.lt